

ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง การป้องกันโรคและภัยอุบัติการที่เกิดในศุภหน้าวช่องประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ໄສກອງຈາກຮ່າງໃນເທິກ ๐ - ๕ ປີ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ

โรงพยาบาลราชวิถี 0 - ๕ ปี เป็นโรงพยาบาลราชวิถีที่พบได้ลดลงทั้งปีในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว และเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการป่วยด้วยโรคติดต่อ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม ๒๕๕๘ มีรายงานผู้ป่วยโรงพยาบาลราชวิถี ๐ - ๕ ปี รวม ๒๙๔,๗๘๕ ราย อัตราป่วย ๖,๕๓๒.๖๖ ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมาณ ๑.๓ เท่า และพบผู้เสียชีวิต ๑ ราย เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี เสียชีวิตรจากภาวะขาดน้ำรุนแรง คาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะสูงขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อาจมีผู้ป่วยประมาณ ๒๖,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ รายต่อเดือน

• ๒๐๘๖/๑๐๐๗

❖ การบันทึกและอ่านภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์

๖. ควรให้อาหารเหลวแก่เด็กบอยครึ้ง เช่น น้ำข้าวต้ม น้ำยำกงจิต รวมทั้งน้ำนมเย็น หรือนมผงสมูท์ฟลุ๊วให้ เจือจางลงครึ่งหนึ่ง ถ้าเด็กยังจำกัดบ่อยการผลสสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ (สูตรขององค์การเภสัชกรรม หรือองค์กรการ อนามัยโลก) ให้เติมดื่มน้ำอ้อยแต่บ่อยครึ้งในปริมาณเท่ากับปริมาณอุจจาระที่ถ่ายออกมาก่อนแล้วครึ้ง เมื่ออาการดี ขึ้น ให้หยุดดื่มน้ำสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ และรับประทานอาหารอ่อนบอยร่างกาย ได้แก่ โจ๊ก ข้าวต้ม จะช่วยให้เด็ก อาการกลับเป็นปกติได้ภายใน ๔ - ๕ ชั่วโมง หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

๖. ควรเลี้ยงดูกุกตัววัยนร膺 เมื่อจะมีเพศสัมภ์กับภัยและทำให้เด็กมีภัยด้านหานต่อเชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งให้เด็กรับประทานอาหารที่สดใหม่ๆ และคืนน้ำด้วยสัก

๓. ผู้ดูแลเด็กต้องเข้มงวดเมื่อฟอกสีให้สะอาดหอยปูเน่นๆ โดยเฉพาะทุกครั้งก่อนการเตรียมอาหาร และห้ามนำเข้าห้องน้ำ

๔. ให้เด็กที่ป่วยด้วยอุจจาระในภายนอกห้องรับมิตรชั้น แม้ว่าบ้านไปกำลังในส่วนที่ถูกอนุญาตให้เดิน เนื่องในวันนี้ เด็กจะต้องห้ามเดินทางไป และล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งหลังขับถ่าย

માર્ગદર્શિકા

๖. รับประทานอาหารที่สะอาดปุ่งสุกใหม่ๆ ไม่มีเยลล์รันค่อน สำหรับอาหารค้างมือควรอุ่นให้ร้อนจัด ก่อนรับประทานทุกครั้ง หลีกเลี่ยงอาหารดิบหรือคิบๆ สุกๆ โดยเฉพาะอาหารทะเล คิมน้ำสะอาด เช่น น้ำดั้มสุก น้ำดัมบรรจุขวด น้ำดีผ่านเครื่องกรองน้ำให้มาตรฐาน น้ำแข็งที่ถูกหลักอนามัย และล้างผักสด ผลไม้ ให้สะอาดก่อนรับประทาน

๖. ภาระน้ำที่ใช้ในการกินและต้มต้องสะอาด และเก็บไว้ในที่มีอุปกรณ์ป้องกันแมลง หู จังจก ໄட້ຕອນ และใช้ผ้าเช็ดรอนอาหาร หรือใส่ตักกับข้าวหรือตู้เย็น ป้องกันแมลงร่วนต้มอาหาร

๓. ล้านมือพอกกฎหมายให้ลักษณะ ก่อนปุ่งอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร ก่อนใช้มือยิบอาหารป้อนเด็ก และหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วมทากครั้ง

๔. ต่ายอุจจาระในห้องส้วมที่ถูกสุขาลักษณะ ดังข่ายความมีฝาปิด และกำจัดขยะบ่อมูลฝอยสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งพำนัชของแมลงวัน

ໃຈລະບົບການ

๒. โรคไข้หวัดใหญ่

❖ สถานการณ์โรค

ตั้งแต่ปี 2557 พบรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น โดยมีผู้ป่วยประมาณ 74,000 - 130,000 รายต่อปี มีรายงานผู้เสียชีวิต 40 - 90 รายต่อปี ทั้งนี้อาจเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว จากการเคลื่อนย้ายของประชากรทั่วโลก โดยเฉพาะในปีที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H1N1(2009) จะพบมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น ผู้เสียชีวิตพบรอบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 45-65 ปีขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่มีโรคเรื้อรังร่วมด้วย ตั้งแต่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ตุลาคม 2559 มีรายงานผู้ป่วย 137,096 ราย ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วประมาณ 2 เท่า เสียชีวิต 47 ราย จากการคาดการณ์พบว่าจำนวนผู้ป่วยในช่วง ฤดูหนาวในปีนี้จะสูงกว่าปีที่แล้ว โดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2560 จะมีผู้ป่วยประมาณ 16,500 - 24,000 รายต่อเดือน และมีแนวโน้มตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H1N1(2009) เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วย โรคนี้พบกระจายตัวทั่วประเทศและพบสูงมากในจังหวัดทางภาคเหนือและภาคกลาง สถานที่ที่มักเกิดการระบาด ได้แก่ ค่ายทหาร โรงเรียนประจำ แคมป์คุนงานก่อสร้าง

❖ สาเหตุ/อาการ

เกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่า อินฟลูเอนซ่าไวรัส (Influenza virus) หรือไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีหลายชนิด คือ Influenza A B และ C พบรากในฤดูฝนและฤดูหนาว ติดต่อได้โดยการไอ จาม หรือสัมผัสน้ำลาย น้ำลาย ของผู้ป่วย อาการของโรคไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้ ตัวร้อนและรู้สึกหนาวทันที ร่างกายอ่อนเพลียร้า ปวดศีรษะ คอแห้งและเจ็บตามแขนขาและที่หลัง เนื้ออาหาร อาจมีอาการไอแห้งๆ บางทีมีเวียนศีรษะ อาเจียน เสียด กำเดาในสูตร และแน่นหน้าอกร หน้ามักจะแดงและมักมีอาการเยื่อตา เมื่อจูบ และการแพ้อาหารอักเสบด้วย บางรายอาจมีโรคแทรกซ้อนที่ได้บ่อย คือ ปอดอักเสบ

❖ ภาระปฏิบัติและควรรักษาเมื่อเจ็บป่วย

1. ผู้ป่วยควรหยุดเรียน หยุดงานและพักอยู่บ้านหรือห้องพัก ไม่ออกไปนอกรบ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันหลังเริ่มป่วย หรือหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย ๑ วัน ให้น้ำมากๆ ป้องกันโรค และล้างมือบ่อยๆ บนพื้นผิวน้ำยาๆ ตีมน้ำสะอาดและพยายามรับประทานอาหารอ่อนๆ ผักและผลไม้ให้พอเพียง

2. ให้ผู้ป่วยรับประทานยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล (ห้ามใช้ยาแอสไพริน) เช็คตัวลดไข้ และคุ้มครองร่างกายให้อ่อนอุ่น และรับประทานยาตามคำแนะนำของเภสัชกร หรือคำสั่งแพทย์

3. หากอาการป่วยรุนแรงขึ้น เช่น ไข้ไม่คล่อง kapsain ใน 2 วัน ซึ่งหรืออ่อนเพลียมาก รับประทานอาหารไม่ได้ โอมากจนเจ็บหน้าอกร เกิดปอดบวม (หายใจลำบาก หอบ เหนื่อย) ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที

❖ ภาระป้องกัน

1. ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและอากาศถagnant เช่น สถานที่ที่ขาดเรียน ฯลฯ ให้ช้อนกลางทุกครั้ง เมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น และห้ามลิ้นน้ำมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ เช็คทำความสะอาดพื้นผิวและสิ่งของที่มีคนสัมผัสบ่อยๆ เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อ

2. โรงเรียน สถานประกอบการ ควรจัดให้มีสถานที่สำหรับล้างมือ พร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือที่มีผู้ใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ตรวจสอบจำนวนบุคคลการที่ขาดเรียน ขาดงานผิดปกติ หากสงสัยว่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันทีเพื่อควบคุมโรค ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ควรไปรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ต้องได้บุคลากรที่มีอาการป่วยล้าบ่ายอย่างน้อย 7 วัน หลังเริ่มป่วย

โรคเมือง เท้า ปาก

๓. ໂຮມນີ້ອ ໜ້າ ປົກ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยโรคเมือ เท้า ปาก รวมทั้งสิ้น ๗๖,๔๕๔ ราย จากทุกช่วงวัยทั่วประเทศ คิดเป็นอัตราป่วย ๑๗๐.๔ ต่อประชากรแสนคน พบรอยป่วยเดียวกัน ๓ ราย อายุ ๘ เดือน ถึง ๕ ปี จาก จังหวัดเชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา และอุบลราชธานี พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงมากเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ๒๕๕๙ แม้ว่าในเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม ๒๕๕๙ จะมีรายงานผู้ป่วยลดลง แต่ก็ยังต้องระมัดระวังการระบาดในช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้า จากการคาดการณ์จำนวนผู้ป่วยรายเดือน คาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยประมาณ ๖,๗๐๐ - ๗,๐๐๐ รายต่อเดือน ในช่วงเดือน พฤษภาคมถึงกันยายน ๒๕๕๙ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ສາທາລະນະ/ວັດທະນາ

เกิดจากเชื้อเอ็นแทรโวิรัสสายชนิด (Enterovirus) ที่พบบ่อย คือ ไวรัสเอนโคไวรัส (Echovirus) และไวรัสเอนแทรโวิรัส ๗๙ (Enterovirus ๗๙ หรือ EV ๗๙) ส่วนมากพบในการรักษาเด็ก พบประปรายตลอดทั้งปีและพบผู้ป่วยมากขึ้นตั้งแต่ครูปจนถึงฤดูหนาว ส่วนใหญ่เด็กจากไดรับเชื้อไวรัสเข้าไปทางปากโดยตรง จากการดิบมา กิน มือหรือของเล่นที่เปื้อนม้าลาย น้ำนม น้ำจากช่องทางและแมลง หรืออุจจาระของเด็กป่วย

อาการเรื้อรังตัวยิ่ง อ่อนเพลีย ประมาณ ๑ - ๒ วัน มีอาการเจ็บปากและเบื้องอาหาร เนื่องจากมีแพลลักกับเส้นที่ลิ้น เหงือก และกระดูกยั่ว ต่อมอาจจะเกิดผื่นแดง ซึ่งมักไม่คันที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้าและอาจพบที่ก้น หรือหัวเข่าได้ ผื่นนี้จะกลایเป็นตุ่มพองใสรอๆ แดง และแพลลักออกเป็นหลุมตื้นๆ

❖ ภารกิจบริการและผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

โรคนี้ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง มักป่วยนานประมาณ ๗ - ๑๐ วัน และหายได้เอง โรคนี้เป็นมียาต้านไวรัสชนิดนี้โดยเฉพาะ จึงใช้การรักษาเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ เช่น การให้ยาลดไข้ร่วมกับการเช็คตัวลอดไข้ ให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารอ่อนๆ อย่างจ่าย รสไม่จัด ดื่มน้ำ ฯลฯ หรือน้ำหวาน และบนอนพักผ่อนให้เพียงพอ บางรายอาจเป็นโรคเมือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรง เช่น มีไข้สูง ชีบ อาเจียน หนองเหนือย ต้องรับไปรักษาแพทย์

ກາງປ້ອງກັນ

๑. การดูแลอุปกรณ์ห้องน้ำส่วนบุคคลที่ดี เช่น การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลล้างมือทุกครั้ง ก่อนและหลังรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย การเล่นของเล่น และหมอนล้างมือบ่อยๆ ตัดเตือนให้สับสน
 ๒. การดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น กำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลที่อยู่ก็ต้อง ดูแลรักษาและทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ มือ เครื่องใช้ และของเล่นต่างๆ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 ๓. ไม่ควรนำเด็กเล็กไปในที่ชุมชน ในช่วงที่มีการระบาด เช่น สนามเด็กเล่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด หรือ สรรว่ายน้ำ ควรอยู่ในที่มีอากาศดีถ่ายเทได้ดี
 ๔. เด็กที่ป่วยเป็นโรคเมือ เท้า ปาก ควรหยุดพักรักษาตัวที่บ้านประมาณ ๑ สัปดาห์ หรือจนกว่าจะหาย เป็นปกติ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้เด็กอื่นๆ

๔. กิจกรรมการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส

❖ สถานการณ์โรค

การเดินทางพักผ่อนในที่พัก โรงแรม รีสอร์ฟต่างๆ ช่วงอากาศหนาวเย็น อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการป่วย และเสียชีวิตจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐานในสถานที่พักดังกล่าวได้ ระหว่างปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙ สำนักระบบทวิทยาได้เฝ้าระวังเหตุการณ์การป่วยและเสียชีวิตขณะอาบน้ำในห้องน้ำที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้ระบบแก๊ส พบร่วม มีรายงานทั้งสิ้น ๑๖ เหตุการณ์ มีผู้ป่วย ๒๘ ราย เสียชีวิต ๖ ราย อายุระหว่าง ๒ - ๕๕ ปี เกิดเหตุในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกปี ส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย พบร่วม สถานที่พักต่างๆ ได้แก่ รีสอร์ฟ ๑๖ ราย โรงแรม ๔ ราย ที่พักราชการ ๔ ราย สถานที่ปฏิบัติธรรม ๔ ราย บ้าน ๓ ราย และโรงเรียน ๑ ราย โดยเฉพาะปี ๒๕๕๙ ได้รับรายงาน ๗ เหตุการณ์ มีผู้ป่วย ๕ ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งมี หลายเหตุการณ์ที่มีการอาบน้ำต่อเนื่องกันหลายคนและผู้ป่วยหรือเสียชีวิตเป็นผู้ที่อาบน้ำในลำดับหลังๆ

❖ สาเหตุ/อาการ

จากการสอบถามทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมา พบร่วมกิจกรรมการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีมาตรฐาน (มอก.) ที่ น้ำเข้าจากประเทศอินทีนิลaley ห้อง และมีการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานไม่เหมาะสมกับสภาพและขนาดห้องน้ำ มี ช่องระบายน้ำจากคานชาตเล็ก หรือปั๊ม/ไม่เปิดพัดลมดูดอากาศ จากการตรวจสอบปริมาณแก๊สใน ๖ เหตุการณ์ พบร่วมมีปริมาณแก๊สค่ารับอนุมอนออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้แก๊สไม่สมบูรณ์ มีระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อ ทดสอบงวดทุก ๑๐ นาที ระหว่างการอาบน้ำที่เปิดเครื่องทำน้ำอุ่น ซึ่งหากมีระดับแก๊สค่ารับอนุมอนออกไซด์มาก กว่า ๑,๐๐๐ ppm. จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย โดยทำให้เม็ดเลือดแดงจับออกซิเจนได้น้อยลง เกิดอาการ หน้ามืด มึนง ชาดอากาศหายใจ หมดสติ และทำให้เสียชีวิตได้

❖ แนวทางแก้ไขและข้อปฏิบัติ

๑. เจ้าของกิจการหรือนวยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำห้องเที่ยว เช่น อุทมานแห่งชาติ ที่พักนวยงาน ราชการ เจ้าของโรงแรม รีสอร์ฟ หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมฯ ฯ ที่มีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ควรตรวจสอบ เครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้ระบบแก๊สให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยติดตั้งในห้องที่มีการระบายน้ำอากาศที่เพียงพอ ติดป้ายเตือน และบอกถึงวิธีใช้งานของเครื่องทำน้ำอุ่นไว้อย่างชัดเจน

๒. ผู้ที่เข้าพักอาศัยในที่พักดังกล่าวควรสังเกตอาการที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับแก๊สระหว่างอาบน้ำใน ห้องน้ำ เช่น วิงเวียน หน้ามืด หายใจลำบาก ควรรีบออกจากห้องน้ำ และให้การช่วยเหลือทันที

๓. คนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ ควรให้ความ ระมัดระวังมากขึ้นในการใช้ห้องน้ำที่มีเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้ระบบแก๊ส เพราะหากได้รับแก๊สดังกล่าวจะทำให้ เสียชีวิตได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น ๆ

๔. การให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าพักอาศัยในที่พักที่มีการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้ระบบแก๊สอย่าง ต่อเนื่อง

กู๊ดกัน - กู๊ดกันส์กู๊ดกันกู๊ดกันกู๊ด

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ในความเป็นจริงแล้ว มนุษย์ไม่สามารถทำได้ มนุษย์ต้องการความสุข แต่ความสุขนั้นต้องมีความทุกข์อยู่ด้วย

การนัดหมายคุณให้คุรุศาสตร์ตามวันและเวลาที่คุณต้องการ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ห้องประชุม จึงทำให้คุณมีเวลาอ่านหนังสือ หรือพักผ่อนอย่างเพลิดเพลินมากขึ้น

studieren kann

Immer wieder ist es mir gelungen, die Freude am Schreiben zu entdecken und wiederzufinden.

卷之三

1. หลักสัมภารสัมภส พ่อสอนลูกน้อยว่าต้องรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองไม่ให้เสียหาย

ສານແຜນ ອາການ

ສານແຜດ ອາການ

การจัดการธุรกิจ

DRAFTS OF THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES

סבב קהילתי

น้ำเงินเข้มที่สุดในโลก ด้วยการบดหินฟ้าที่มีสีฟ้าเข้ม ผสมกับสีขาวและสีเหลือง ทำให้เกิดสีที่มีความลึกซึ้งและสง่างาม

“โรคตับเรื้อรัง” หรือ “โรคร้ายที่ไม่ร้าย” คือ โรคทางเด็กที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความเสียชีวิตในเด็กไทย 4 อันดับแรก ตามผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 4 ปีที่ผ่านมา พบว่าเด็กไทยที่มี “โรคตับเรื้อรัง” มากกว่า 1 ใน 10 คน แสดงถึงความสำคัญของปัจจัยทางสังคมและทางการแพทย์ที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก ในการเฝ้าระวังและดูแลเด็กไทย ให้สามารถเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและมีคุณภาพ

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

סעיף ענין

ก้าวสู่ความสำเร็จ

הנְּבָאָה בְּנֵי לְבִנְיָם

卷之三

1. กองบังคับการให้หน่วยงานที่ได้รับโควิด 19 ชั่วคราวในสังกัด และเรียกตัว
2. ผู้บังคับการพัฒนาและปรับปรุงภารกิจตามความต้องการของทางราชการไม่ใช่
3. เดือนกันยายนนี้ไปออกใบเรียกเข้า 1 สัญญา
4. ต้องมีผู้อุปถัมภ์และผู้ดูแลเดินทางมา

କୁଳାଚୀନିର୍ମାଣ

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ในทางทฤษฎีแล้ว ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้คนทั่วโลกเข้าใจและปฏิบัติตามได้ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว มนุษย์ทุกคนต้องมีความต้องการที่ต่างกัน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางการเมือง หรือทางวัฒนธรรม ก็ตาม ดังนั้น การจัดการความต้องการของมนุษย์จึงเป็นภารกิจที่สำคัญมาก

עֲמָקָם תְּשׁוֹבָה

MIGRATION AND THE STATE: CHINESE

卷之三